

Överenskommelse vid behandling med narkotikaklassade ADHD-läkemedel

Forskning visar att ADHD-läkemedel är effektiva för många patienter med ADHD, då de kan förbättra svårigheter och symtom vid ADHD, exempelvis förmågan att reglera sin uppmärksamhet och sina impulser.

ADHD-läkemedel är centralstimulerande, innehåller amfetamin eller amfetaminliknande substanser och är därför narkotikaklassade: Exempel på dessa är:

Concerta®, Methylphenidate Sandoz®, Equasym®, Medikinet®, Ritalin® och Elvanse®.

För att möjliggöra förskrivning som är patientsäker och för att undvika felanvändning av dessa narkotikaklassade läkemedel, har vi följande riktlinjer och krav:

1. Att patienten godkänner att vi får gå in i Läkemedelsförteckningen för kontroll av läkemedelsförskrivning
2. Drogprov vid begäran av förskrivare
3. Drogfrihet, för förskrivning. Detta inkluderar även intag av narkotikaklassade mediciner som inte är ordinerade eller förskrivs av oklar anledning.
4. Mediciner som tappas bort ersätts ej innan nästa intervall
5. Mediciner skrivs inte ut vid hot om förskrivning
6. Mediciner får inte ges till andra än till den som förskrivits medicinen

Uppdaterad 2019-01-03